

NOTE XII.

DEUX ESPÈCES NOUVELLES DE COLÉOPTÈRES DE
LA FAMILLE DES NITIDULIDAE

DÉCRITES PAR

A. GROUVELLE.*Carpophilus Bosschae*, n. sp.

Ovatus, vix convexus, nitidus, glaber, testaceo-piceus; clava antennarum infuscata; capite prothoraceque sat fortiter punctatis, margine antico prothoracis emarginato, postico utrinque sat profunde sinuato; angulis anticis productis, posticis acutis; elytris punctatis, apice oblique truncatis, versus suturam in longitudine impressis, humeris dentatis. — Long. 1 $\frac{1}{2}$ mill.

Ovale, faiblement convexe, glabre, brillant, testacé, plus ou moins enfumé sur la tête, le disque du prothorax et le pourtour des élytres. Base des antennes et pattes plus claires.

Ponctuation de la tête et du prothorax assez forte, un peu écartée, plus serrée vers les angles postérieurs du prothorax. Front convexe, angles postérieurs de la tête à peine marqués. Prothorax environ deux fois plus large que long, assez rétréci en avant; bords latéraux parallèles dans la moitié basilaire; marge antérieure largement échancrée, postérieure droite devant l'écusson, assez fortement échancrée de chaque côté; angles antérieurs saillants, un peu émoussés, postérieurs aigus; disque légèrement déprimé devant ces derniers; marges latérales et basilaires rebordées. Ecusson subpentagonal, finement et très éparsement ponctué. Elytres

moins longs que larges ensemble, présentant leur plus grande largeur un peu avant la base, tronqués obliquement au sommet, laissant à découvert deux segments de l'abdomen; ponctués moins fortement que le prothorax, impressionnés contre la base de la suture. Angles huméraux dentés.

Hab. Bornéo occidental: Sambas (Dr. Bosscha). — Trois exemplaires dont un dans la collection du Musée de Leyde.

Parametopia Bosschae, n. sp.

Ovata, subconvexa, nitida, glabra, picea; antennis, pedibus et lateribus prothoracis elytrorumque dilutioribus, singulo elytro rufo bi-maculato; capite bi-impresso, lateribus prothoracis elytrorumque sat late explanatis. — Long. 3 mill.

Ovale, légèrement convexe, brillant, glabre, couleur de poix; marge antérieure de la tête, bords latéraux du prothorax et des élytres, antennes et pattes plus clairs. Sur chaque élytre deux taches rougeâtres; la première transversale, légèrement réniforme, sur la moitié basilaire; la deuxième, ovale, sur la seconde moitié.

Tête assez densément ponctuée, strie interantennaire effacée au milieu, prenant naissance de chaque côté dans une impression assez large, peu profonde. Ponctuation du prothorax assez dense, entremêlée de gros points sur les côtés; marges latérales explanées, un peu relevées. Ponctuation des élytres un peu plus forte que celle du prothorax surtout sur les côtés; rebords latéraux explanés, ponctués, séparés de la partie convexe des élytres vers la base par une strie ponctuée de gros points.

Voisin de *Parametopia (Prometopia) rotundata* Reitt. mais plus petit et moins foncé; 2^{me} tache plus apicale, et ponctuation des côtés du prothorax double.

Hab. Bornéo occidental: Sambas (Dr. Bosscha). — Un seul exemplaire dans la collection du Musée de Leyde.

Paris, Janvier 1892.